



## Que faire avant d'initier un anti-TNF ?

Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Cette check-list a pour objectif de vous aider à chercher systématiquement les principales contre-indications ou précautions d'emploi des anti-TNF. Elle ne comprend pas le bilan d'activité ni de sévérité de la maladie justifiant ce traitement.

En présence de l'un de ces signes, situations et/ou pathologies, se référer aux fiches pratiques correspondantes avant toute instauration d'un traitement par anti-TNF.

<b>À l'interrogatoire, rechercher :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antécédent d'infections sévères, chroniques et/ou récurrentes (bactériennes, virales)</li> <li>- Antécédent ou contact avec un cas de tuberculose</li> <li>- Antécédent de cancer solide, hémopathie, lymphome</li> <li>- Antécédent d'affection préneoplasique (polypose, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), œsophagite, dysplasie du col)</li> <li>- Antécédent de sclérose en plaques, de névrite optique ou de neuropathie démyélinisante</li> <li>- Antécédent d'affection auto-immune systémique (lupus, hépatite, vascularite)</li> <li>- Pneumopathie interstitielle, BPCO, asthme sévère</li> <li>- Dyspnée d'effort et autres signes fonctionnels d'insuffisance cardiaque</li> <li>- Vaccination récente avec vaccin vivant (fièvre jaune, BCG)</li> <li>- Grossesse, désir de grossesse.</li> </ul>
<b>Les vaccinations :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- On proposera une mise à jour des vaccinations avec vaccin inactivé sans retarder l'initiation du traitement</li> <li>- Grippe annuelle</li> <li>- DTPolio tous les 10 ans</li> <li>- Vaccination contre le pneumocoque               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non préalablement vaccinés ou vaccinés depuis plus de 3 ans par le vaccin polysidique non conjugué 23-valent (PPV23 ou Pneumovax®) : une dose de vaccin conjugué 13-valent (PCV13 ou Prevenar13®) puis une dose de Pneumovax® au moins 2 mois après</li> <li>• Vaccinés par Pneumovax® : attendre un délai d'au moins 1 an après la vaccination par Pneumovax® pour vacciner avec une dose de Prevenar13®. L'injection ultérieure du Pneumovax® sera pratiquée avec un délai minimal de 5 ans par rapport à la date de la dernière injection du Pneumovax®.</li> </ul> </li> </ul>
<b>À l'examen clinique, rechercher :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fièvre</li> <li>- Infection évolutive</li> <li>- Adénopathies</li> <li>- Signes orientant vers une néoplasie et/ou une hémopathie</li> <li>- Signes d'insuffisance cardiaque décompensée</li> <li>- Signes broncho-pulmonaires</li> <li>- Signes d'auto-immunité</li> <li>- Signes d'affection démyélinisante.</li> </ul>

<p><b>Les examens complémentaires à demander systématiquement en 1<sup>ère</sup> intention :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hémogramme</li> <li>- Electrophorèse des protéines sériques</li> <li>- ASAT/ALAT</li> <li>- Radiographie du thorax</li> <li>- Test <i>in vitro</i> Quantiféron Gold® ou T-Spot-TB® ou Intradermoréaction à la tuberculine 5 UI (Tubertest®)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si lors d'un précédent dépistage un traitement antituberculeux préventif a été prescrit, le dépistage ne sera pas renouvelé</li> <li>• Si un précédent dépistage &gt;2 ans était négatif, il est conseillé de le refaire</li> <li>• Si le dépistage n'a jamais été fait, il est recommandé de suivre les recommandations de l'ANSM pour le dépistage des tuberculoses latentes.</li> </ul> </li> <li>- Sérologies hépatites B et C et avec accord du patient, sérologie VIH</li> <li>- Anticorps anti-noyaux</li> <li>- Application des règles de bonnes pratiques de dépistage des facteurs de risque de néoplasie.</li> </ul>
<p><b>Contre-indications :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients</li> <li>- Tuberculose active, infections graves telles qu'une septicémie ou des infections opportunistes</li> <li>- Insuffisance cardiaque modérée à sévère (NYHA classes III/IV).</li> </ul>
<p><b>Précautions d'emploi :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pathologies neurologiques démyélinisantes</li> <li>- Pneumopathie interstitielle</li> <li>- Affection auto-immune systémique</li> <li>- Affections malignes</li> <li>- Vaccination récente avec vaccin vivant.</li> </ul>

Pour plus de détails, se référer aux fiches correspondantes.