



Conduite à tenir en cas de voyage

Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Les malades traités par abatacept IV peuvent, bien entendu, voyager entre deux dates de perfusions, mais certaines précautions particulières doivent être prises.

Les patients traités par abatacept SC doivent conserver leur traitement entre 2 et 8°C et ne pas le congeler. Idéalement, le transport et la conservation se feront dans l'emballage extérieur d'origine et à l'abri de la lumière.

Il faudra tenir compte de ces paramètres en cas de voyage en avion, à l'étranger (ordonnance avec DCI, idéalement rédigée en anglais pour le passage des douanes) et/ou pendant une longue période de temps.

- Aucune recommandation précise n'est donnée dans le Résumé des Caractéristiques Produit (1) et les conseils présentés sont fondés sur des avis d'experts.

- Pour se rendre dans certains pays d'Afrique, d'Amérique Centrale ou du Sud, la vaccination contre la Fièvre Jaune est indispensable mais est contre-indiquée chez les sujets traités par abatacept. Avant de réserver un voyage à destination d'un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou Centrale, il est impératif de se renseigner pour savoir si la vaccination anti-amarile est nécessaire voire obligatoire. Si c'est le cas, le patient doit en parler le plus rapidement possible à son médecin (voir fiche «Vaccinations»). Pour tous renseignements concernant les vaccinations nécessaires pour se rendre dans un pays étranger, des sites web apportent des informations, en particulier :

<http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/voyageurs.html>

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

- La prophylaxie antipaludéenne n'est pas contre-indiquée (1). Aucun problème majeur de tolérance n'a été identifié lors de l'utilisation d'abatacept en association avec l'hydroxychloroquine (1). Dans l'étude ASSURE (2), évaluant sur un an la tolérance d'abatacept versus placebo, en adjonction à un traitement d'action lente classique ou biologique, l'hydroxychloroquine/chloroquine était présente entre 10,9 et 29,4% des patients selon les groupes. Il n'a pas été observé de différence significative en termes de fréquence d'effets secondaires, d'effets secondaires graves ou d'arrêt lié à un effet secondaire entre groupe abatacept et groupe placebo.

- Voyager à l'étranger (en milieu tropical, mais pas seulement...) nécessite de respecter des mesures d'hygiène, de prévoir une trousse à pharmacie et de prendre certaines précautions vis-à-vis de l'alimentation (diarrhée/tourista), des insectes (moustiques, mouches...)

- En fonction de la destination, il peut être nécessaire d'orienter votre malade vers une **consultation spécialisée en médecine du voyageur**.

Références

1. Résumé des Caractéristiques du produit Orenzia®. Avril 2014.
Disponible sur www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/.../WC500048935.pdf
2. Weinblatt M, Combe B, Covucci A, et al. Safety of the selective costimulation modulator abatacept in rheumatoid arthritis patients receiving background biologic and nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs: A one-year randomized, placebo-controlled study. *Arthritis Rheum* 2006;54:2807-16.